



# ENTREGA ANUAL DE ÁRBOLES NATIVOS

**Programa Arbolar.UNR**

**Coordinadora: Lic. Ornella Bressan**

**Te invitamos a conocer la ficha técnica de todas las  
especies que serán entregadas**

**¡Sigamos arbolando!**



**Área de Política Ambiental**



**UNR**

## **ÍNDICE**

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b><i>Bauhinia forficata ssp. pruinosa</i> (pezuña de vaca).....</b> | <b>Página 3</b>  |
| <b><i>Ceiba speciosa</i> (palo borracho rosa) .....</b>              | <b>Página 4</b>  |
| <b><i>Celtis tala</i> (tala) .....</b>                               | <b>Página 5</b>  |
| <b><i>Enterolobium contortisiliquum</i> (timbó colorado).....</b>    | <b>Página 6</b>  |
| <b><i>Erythrina crista-galli</i> (ceibo).....</b>                    | <b>Página 7</b>  |
| <b><i>Geoffroea decorticans</i> (chañar).....</b>                    | <b>Página 8</b>  |
| <b><i>Handroanthus heptaphyllus</i> (lapacho negro).....</b>         | <b>Página 9</b>  |
| <b><i>Inga edulis</i> (ingá).....</b>                                | <b>Página 10</b> |
| <b><i>Jacaranda mimosifolia</i> (Jacarandá).....</b>                 | <b>Página 11</b> |
| <b><i>Libidibia paraguariensis</i> (guayacán).....</b>               | <b>Página 12</b> |
| <b><i>Neltuma alba</i> (algarrobo blanco).....</b>                   | <b>Página 13</b> |
| <b><i>Parkinsonia aculeata</i> (cina-cina).....</b>                  | <b>Página 14</b> |
| <b><i>Pseudalbizzia inundata</i> (timbó blanco).....</b>             | <b>Página 15</b> |
| <b><i>Ruprechtia apétala</i> (manzano de campo).....</b>             | <b>Página 16</b> |
| <b><i>Senna corymbosa</i> (sen de campo).....</b>                    | <b>Página 17</b> |
| <b><i>Sesbania virgata</i> (rama negra).....</b>                     | <b>Página 18</b> |
| <b><i>Vachellia aroma</i> (tusca).....</b>                           | <b>Página 19</b> |
| <b><i>Vachellia caven</i> (aromito).....</b>                         | <b>Página 20</b> |
| <b><i>Paso a paso para una buena plantación</i>.....</b>             | <b>Página 21</b> |

1-Especie: *Bauhinia forficata* ssp. *pruinosa*

**Nombre común: Pezuña de vaca**

**Descripción:** Árbol perennifolio (hojas persistentes) con espinas, de 3 a 9 m de alto, de copa redondeada (Fig. 1). Hojas simples, alternas de lámina bilobulada. **Flores:** blancas, grandes y vistosas (Fig. 2). **Fruto:** legumbre subleñosa, aplanada con dehiscencia elástica. Florece en primavera y verano y fructifica de noviembre a marzo. **Origen y distribución:** Especie nativa del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina. **Usos y curiosidades:** Se emplea como ornamental, se utiliza en el arbolado público y como cerco vivo (a veces). Además, se multiplica con facilidad gracias a sus raíces gemíferas. Esta especie es sensible a las heladas.

-Riego: moderado

-Asoleamiento: sol pleno

-Crecimiento: rápido



Fig. 1: Ejemplar adulto de *B. forficata* ssp. *pruinosa*



Fig. 2: flores

**2-Especie:** *Ceiba speciosa*

**Nombre común:** Palo borracho rosa

**Descripción:** Árbol caducifolio (sus hojas se caen en otoño/invierno) de hasta 20 m de altura (Fig. 3). Su tronco tiene forma de botella y la corteza es lisa, verde-grisácea, con agujones cónicos (Fig. 4). Hojas palmaticompuestas, formadas por 5–7 folíolos. Las **flores** son rosadas o rojizas, solitarias o en grupos (Fig. 5). El **fruto** es una cápsula coriácea, elipsoide, de tonalidad castaña cuando está madura que al abrirse deja visible los pelos sedosos llamados painas. Florece desde el verano a mediados de otoño. **Origen y distribución:** Especie nativa de Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia. **Usos y curiosidades:** Esta especie se utiliza como ornamental y medicinal. Se usa en plazas, paseos y avenidas debido a su gran porte y a su vistosa floración. Se emplea para fabricar bombos, barriles, canoas y como pasta para papel. Las painas, se utilizan para el relleno de almohadas, colchones, salvavidas y como aislante térmico y acústico. En medicina popular, se realizan preparados con los agujones para combatir el asma y reducir el azúcar en sangre

-Riego: medio

-Asoleamiento: pleno sol/ sombra parcial

-Crecimiento: rápido



Fig. 3: Ejemplares de palo borracho




Fig. 4: Ejemplares de palo borracho



Fig. 5: Flores de palo borracho

### 3- Especie: *Celtis tala*

#### **Nombre común: Tala**

**Descripción:** Árbol caducifolio (sus hojas se caen en otoño/invierno) y espinoso (de 4–8 m de alto) de corteza lisa, grisácea, agrietada en ejemplares adultos (Fig. 6). Ramas en zigzag (Fig. 7). **Flores:** verde – amarillentas, pequeñas. **Fruto:** drupa ovoide, amarillo–anaranjada, carnosa, algo dulce (Fig. 8). Florece de septiembre a octubre y fructifica a fines de primavera y durante el verano. **Origen y distribución:** especie nativa de Sudamérica. Crece en Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y centro–norte de Argentina. **Usos y curiosidades:** Se emplea como forestal, frutal, medicinal y tintórea. Los frutos son comestibles, de sabor dulzón, y se consumen principalmente frescos, también son muy apetecidos por las aves que facilitan su dispersión, antiguamente se usaban como alimento para gallinas. Las hojas del tala son ricas en flavonoides, compuestos que tienen actividad antibacteriana. Como tintórea, las raíces hervidas sirven para teñir telas de tonalidades color café. Esta especie requiere pocos cuidados y es resistente a heladas y sequías.

-Riego: escaso

-Asoleamiento: pleno sol/ sombra parcial

-Crecimiento: lento



Fig. 6: Ejemplar de *C. tala*




Fig. 7: Ramas en zigzag



Fig. 8: Frutos

#### 4-Especie: *Enterolobium contortisiliquum*

##### **Nombre común: Timbó colorado**

**Descripción:** Árbol caducifolio (sus hojas se caen en otoño/invierno), robusto, hasta 30 m de alto, decopa extendida (Fig. 9) y corteza lenticelada, castaño-grisácea.

**Flores:** blancas, pequeñas, reunidas en cabezuelas globosas (Fig. 10).

**Fruto:** legumbre leñosa, negra a la madurez, semicircular, de forma similar a una oreja humana (Fig. 11). Florece de octubre a enero y fructifica de enero a abril.

**Origen y distribución:** especie nativa de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La polinización es entomófila (por insectos) y la dispersión de sus frutos muy livianos es hidrócora (por agua). **Usos y curiosidades:** Se cultiva como ornamental y forestal. Se destaca por su copa amplia que brinda abundante sombra. Es una especie de rápido crecimiento y por ello se recomienda su cultivo para recomponer áreas degradadas. La corteza y los frutos contienen saponinas y sirven para lavar (de modo similar a los jabones).

-Riego: abundante

-Asoleamiento: sombra parcial

-Crecimiento: rápido



Fig. 9: Ejemplar de *E. contortisiliquum*



Fig. 10: Inflorescencia



Fig. 11: Frutos

## 5-Especie: *Erythrina crista-galli*

### Nombre común: Ceibo

**Descripción:** Árbol caducifolio (sus hojas se caen en otoño/invierno), hasta 12 m de alto, de tronco breve, tortuoso y copa redondeada (Fig. 12). Hojas: trifolioladas, alternas.

**Flores** amariposadas, rojo-carmín, grandes y vistosas, agrupadas en inflorescencias (Fig. 13). **Fruto:**

legumbre castaño – negruzca, larga y angosta, comprimida entre las semillas (Fig. 14). Florece comúnmente de noviembre a abril y fructifica de enero a abril.

**Origen y distribución:** especie nativa del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y centro-norte de Argentina. Es común en lugares bajos, inundables y a lo largo de cursos de agua. **Usos y**

**curiosidades:** Se emplea como ornamental, forestal, medicinal, tintórea y melífera. Es poco apropiada para calles por su extensa copa y ramificaciones tortuosas, pero apta para parques y plazas. Es la Flor Nacional de la República Argentina. Actualmente se estudian los pigmentos de la flor de ceibo (denominados antocianinas) para ser utilizados como sensibilizadores naturales en celdas fotovoltaicas, en reemplazo de las celdas solares convencionales de silicio.

-Riego: abundante/moderado

-Asoleamiento: sol pleno/sombra parcial

-Crecimiento: rápido



Fig. 12: Ejemplar de *E. crista-galli*



Fig. 13: Hojas e inflorescencia



Fig. 14: Frutos

**6- Especie:** *Geoffroea decorticans*

**Nombre común:** Chañar

**Descripción:** Árbol perennifolio, espinoso, de 3 a 10 m de alto, su corteza se desprende en láminas parduzcas, observándose el tronco nuevo, verdoso y liso en individuos juveniles (Fig.15). Hojas: compuestas y alternas. **Flores** amarillas con estrías rojas y fragantes (Fig. 16). **Fruto:** drupa ovoide o globosa, anaranjada-rojiza en la madurez de superficie lisa. Florece al finalizar el invierno y principio de la primavera y fructifica de noviembre a febrero. **Origen y distribución:** especie nativa de Sudamérica. Crece en Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. **Usos y curiosidades:** Se emplea como forestal, medicinal, frutal y melífera. Cuando florece es visitado por abejas domésticas y silvestres, ya que ofrecen polen y néctar. Esta especie es resistente a las heladas y suele formar comunidades casi puras debido a la presencia de raíces gemíferas.

-Riego: moderado

-Asoleamiento: sol pleno/sombra parcial

-Crecimiento: lento



Fig. 15: Corteza de individuo juvenil



Fig. 16: Hojas e inflorescencia

**7- Especie:** *Handroanthus heptaphyllus*

**Nombre común: Lapacho negro**

**Descripción:** Árbol caducifolio (sus hojas se caen en otoño/invierno) que puede llegar a medir hasta 30 m de alto, su corteza es grisáceo negruzca (Fig. 17). Hojas compuestas, **flores** rosadas a violáceas (rara vez blancas) y de forma tubular– acampanada (Fig. 18). El **fruto** es cápsula linear, cilíndrica y péndula, de color castaño oscuro con semillas aladas (Fig. 19).

**Origen y distribución:** Especie nativa del sur de Brasil, Paraguay, NO de Uruguay y NE argentino (Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos). **Usos y curiosidades:** Su aserrín se emplea para teñir telas o lanas de color amarillo, rosado, gris o marrón, mientras que en medicina popular la decocción de la corteza se emplea como antirreumático y antiinflamatorio.

El «*lapacho blanco*» es un albinismo del lapacho negro.

-Riego: medio/abundante

-Asoleamiento: pleno/media sombra

-Crecimiento: medio



Fig. 17: Ejemplar de *H. heptaphyllus*



Fig. 18: Inflorescencia



Fig. 19: Frutos

## 8- Especie: *Inga edulis*

### Nombre común: Ingá

**Descripción:** árbol perenne (Fig. 20), que puede medir hasta 25 metros de altura, de copa achatada con corteza grisácea. Sus hojas son alternas, paripinnadas con raquis alados de color verde intenso brillante (Fig. 21). **Flores:** agrupadas en densos racimos, blancas tubulares con estambres salientes y fragantes. **Fruto:** Los frutos son vainas cilíndricas, profundamente estriadas. Florece en primavera-verano y fructifica de enero a marzo. **Origen y distribución:** Especie nativa de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinami, Venezuela y Argentina. En nuestro país se encuentra en Jujuy y Salta. **Usos y curiosidades:** Tiene valor ornamental por su copa expandida y densa. Al ser una leguminosa, fija nitrógeno atmosférico enriqueciendo el suelo.

-Riego: moderado

-Asoleamiento: sol pleno

-Crecimiento: rápido



Fig. 20: Ejemplar de *I. edulis*



Fig. 21: Hojas con raquis alado

**9-Especie:** *Jacaranda mimosifolia*

**Nombre común:** Jacarandá

**Descripción:** Árbol semicaducifolio (algunas hojas caen en otoño/invierno), de 6–20 m de alto, de copa extendida (Fig. 22), corteza rugosa, pardo– oscura. **Flores:** en forma de embudo, violetas o lilas (Fig. 23). **Fruto:** cápsula leñosa, aplanada y circular, castaño–oscura a la madurez (Fig. 24). Florece en primavera, al finalizar el verano y en otoño, cuando cesa el tiempo cálido. **Origen y distribución:** Especie nativa de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. **Usos y curiosidades:** Se emplea como ornamental, forestal y medicinal. El jacarandá es uno de los árboles nativos más bellos debido a su porte elegante y al particular colorido de sus flores. En medicina popular la corteza y las hojas, tienen propiedades antibióticas, antiinflamatorias y depurativas de la sangre. Es sensible a las heladas en los primeros años.

-Riego: moderado

-Asoleamiento: pleno sol/ sombra parcial

-Crecimiento: moderado



Fig. 22: Ejemplar de *J. mimosifolia*



Fig. 23: Inflorescencia



Fig. 24: Fruto

**10- Especie:** *Libidibia paraguariensis*

**Nombre común:** guayacán

**Descripción:** Árbol caducifolio (sus hojas se caen en otoño/invierno) de 12-18 metros de alto. Su corteza, fisurada, formada por placas verdes-grisáceas que se desprenden (Fig.25). Hojas: bipinnadas y alternas.

**Flores** amarillo-anaranjadas agrupadas en racimos axilares (Fig. 26).

**Fruto:** legumbre leñosa, elipsoide, lateralmente comprimidas, oscuras y lustrosas (Fig. 27). Florece de octubre a enero y fructifica de febrero a mayo. Origen y distribución: especie nativa de las zonas subtropicales del Gran Chaco (Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina). Florece de octubre a enero y fructifica de febrero a mayo.

**Usos y curiosidades:** los frutos poseen hasta un 25% de tanino, que se usaron para curtir cueros y elaborar una tintura negra.

-Riego: escaso

-Asoleamiento: sol pleno

-Crecimiento: medio



Fig. 25: Ejemplar de *L. paraguariensis*



Fig. 26: Inflorescencia



Fig. 27: Frutos

**11-Especie:** *Neltuma alba*

**Nombre común:** algarrobo blanco

**Descripción:** Árbol caducifolio (sus hojas se caen en otoño/invierno), de 5–15 m de alto, de copa hemisférica o subglobosa (Fig. 28) y ramas retorcidas con espinas. Hojas: compuestas. **Flores:** pequeñas, blanquecinas o amarillentas, fragantes (Fig. 29). **Fruto:** legumbre amarillo pajizo en su madurez, comprimida entre las semillas (Fig. 30). Florece de octubre a diciembre y su fructificación es de diciembre a abril. **Origen y distribución:** especie nativa de Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y centro–norte de Argentina. **Usos y curiosidades:** Se emplea como ornamental, forestal, alimenticia, forrajera, medicinal y melífera. Es apta para ser plantada en zonas áridas y para recuperar áreas degradadas ya que es resistente a la sequía. Proporciona sombra, alimento, bebida, medicina, colorante, madera y combustible. Sus frutos, algo azucarados, son alimenticios y comúnmente se los llama algarrobas. De las algarrobas secas y molidas se obtiene harina que se usa sola o en mezcla con otras harinas en panificación y respstería.

-Riego: moderado

-Asoleamiento: sol pleno

-Crecimiento: intermedio



Fig. 28: Ejemplar adulto de *P. alba*



Fig. 29: Inflorescencia



Fig. 30: Frutos

**12- Especie:** *Parkinsonia aculeata*

**Nombre común:** Cina- Cina

**Descripción:** Arbusto o arbolito caducifolio (sus hojas se caen en otoño/invierno), espinoso, de 3–7 m de alto, de ramas verdes flexuosas a péndulas (Fig. 31). **Flores:** vistosas, de 1–1,5 cm de largo, de pétalos amarillos que se tornan rojos al madurar la flor (Fig. 32). **Fruto:** legumbre cilíndrica, linear (Fig. 33). Florece de noviembre a diciembre y fructifica de diciembre a marzo.

**Origen y distribución:** Especie nativa de amplia distribución en América, desde México hasta Uruguay y centro de Argentina. Habita suelos bajos, inundables, próximos a los cursos de agua. **Usos y Curiosidades:** Se emplea como ornamental y medicinal. Se usa principalmente para armar cercos vivos. En áreas próximas a cursos de agua su crecimiento es muy rápido. Durante la floración es una importante plantamelífera ya que es visitada por abejas y por numerosos insectos que participan activamente de su polinización.

-Riego: moderado

-Asoleamiento: sol pleno/sombra parcial

-Crecimiento: rápido



Fig. 31: Ejemplar de *P. aculeata*



Fig. 32: Inflorescencia



Fig. 33: Frutos

### 13- Especie: *Pseudalbizzia inundata*

#### Nombre común: Timbó blanco

**Descripción:** Árbol caducifolio (sus hojas se caen en otoño/invierno), de 6–16 m de alto, de copa redondeada y corteza lisa, color grisáceo–ceniciento (Fig. 34).

**Flores:** blanco–verdosas, dispuestas en inflorescencias globosas (Fig. 35).

**Fruto:** legumbre lineal, comprimida (Fig. 36). Florece en primavera y verano.

**Origen y distribución:** Especie nativa de Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. En nuestro país habita próximo a las orillas de ríos y en terrenos anegados. **Usos y curiosidades:** se emplea principalmente como forestal y medicinal. Se podría cultivar como ornamental en parques, plazas y paseos, por su generosa sombra. Su madera fresca es de color verdoso, pero al secarse toma una tonalidad rosada. Las resinas que presenta la madera se emplean como materia prima en la fabricación de pinturas e insecticidas. En medicina popular, las hojas (en aplicaciones externas) se utilizan para realizar fricciones y masajes descontracturantes y para curar el acné. Los extractos obtenidos a partir de las partes aéreas tienen actividad antifúngica.

-Riego: abundante

-Asoleamiento: pleno sol

-Crecimiento: intermedio




Fig. 34: Ejemplar de *A. inundata*



Fig. 35: Inflorescencia



Fig. 36: Frutos

**14- Especie:** *Ruprechtia apetala*

**Nombre común:** Manzano de campo

**Descripción:** Árbol que puede llegar a medir 12 metros de altura, de copa redondeada. Las hojas son simples, verdes y caducas (Fig. 37). El árbol es inerme, quiere decir, no tiene espinas. Sus **flores** (Fig. 38) son pequeñas y pueden ser de color rosado pálido (flores masculinas) y rojizas o amarillentas (flores femeninas). El **fruto** es un aquenio alargado que encierra una semilla (Fig. 39). Florece de noviembre a marzo. **Origen y distribución:** Nativa de Paraguay y Argentina (Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis y Tucumán). **Usos y curiosidades:** La madera del Manzano del Campo se emplea para fabricar hormas de calzado, cucharones y otros utensilios. Con el follaje, frotado entre las manos, puede improvisarse una suerte de jabón.

-Riego: moderado

-Asoleamiento: pleno

-Crecimiento: rápido



Fig. 37: Ejemplar de *R. apetala*



Fig. 38: Inflorescencia



Fig. 39: Frutos

**15-Especie:** *Senna corymbosa*

**Nombre común:** Sen de Campo

**Descripción:** Arbusto caduco (sus hojas se caen en otoño/invierno), de 1 a 4 m de altura, con ramas apoyantes, cilíndricas (Fig. 40). **Flores:** amarillas y vistosas (Fig. 41). **Fruto:** legumbre cilíndrica (Fig. 42). Florece en el verano y fructifica en otoño. **Origen y distribución:** especie nativa de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán). **Usos y curiosidades:** Ornamental y medicinal.

-Riego: moderado

-Asoleamiento: pleno sol

-Crecimiento: rápido



Fig. 40: Ejemplar de *S. corymbosa*



Fig. 41: Flores



Fig. 42: Fruto

**16-Especie:** *Sesbania virgata*

**Nombre común:** Rama negra

**Descripción:** Pequeño árbol o arbusto caducifolio (sus hojas se caen en otoño/invierno), que puede llegar a medir 2 o 3 metros de altura. Sus hojas son compuestas, alternas y paripinnadas (Fig. 43). Sus **flores** son de color amarillo y sus **frutos** son legumbres largas, delgadas y comprimidas (Fig. 44 y 45). **Origen y distribución:** Nativa de Argentina.

**Usos y curiosidades:** Es un arbusto laxo de vistosa floración y es polinizada por abejorros y otras especies. No soporta las heladas.

-Riego: abundante

-Asoleamiento: sol pleno

-Crecimiento: rápido



Fig. 43: Ejemplar de *S. virgata*



Fig. 44: Inflorescencia



Fig. 45: Frutos

**17-Especie:** *Vachellia aroma*

**Nombre común:** Tusca

**Descripción:** Árbol caducifolio (sus hojas se caen en otoño/invierno), espinoso de 3-7 m de alto de copa aparasolada (Fig. 46). Sus hojas son bipinnadas y alternas. **Flores:** amarillas agrupadas en cabezuelas globosas y fragantes (Fig.47). **Fruto:** legumbre moniliforme (Fig. 48). Florece de noviembre a diciembre y fructifica de enero a marzo. **Origen y distribución:** Especie nativa de Sudamérica, crece en Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y centro-norte de Argentina. Es un árbol típico de la región fitogeográfica Chaqueña y del Espinal. **Usos y Curiosidades:** Se emplea como forrajera, medicinal y melífera. En floración es un árbol muy visitado por las abejas por el néctar y polen.

-Riego: escaso

-Asoleamiento: sol pleno

-Crecimiento: intermedio



Fig. 46: Ejemplar de *V. aroma*



Fig. 47: Inflorescencia de *V. aroma*



Fig. 48: Fruto

**18-Especie:** *Vachellia caven*

**Nombre común:** aromito

**Descripción:** Árbol caducifolio (sus hojas se caen en otoño/invierno), espinoso, de 2–6 m de alto, a veces con porte arbustivo (Fig. 49). Corteza castaño–oscura, con profundas grietas longitudinales.

**Flores:** amarillas, pequeñas y perfumadas (Fig. 50). **Frutos:**

legumbre color oscuro a negro, de forma y tamaño algo variable (Fig. 51). Florece en primavera, antes que aparezca el follaje y Fructifica en verano. **Origen y distribución:** Especie nativa de Sudamérica, de amplia distribución en Argentina debido a su gran plasticidad. Crece desde Jujuy hasta Buenos Aires.

**Usos y curiosidades:** Se emplea como ornamental, forestal, curtiente, medicinal y tintórea. Se usa en parques, plazas y como arbolado de alineación por su porte bajo y vistosa floración. En medicina popular, se utiliza por sus cualidades depurativas y desintoxicantes y está especialmente indicada para combatir dolores lumbares y reumatismo.

-Riego: escaso

-Asoleamiento: pleno sol

-Crecimiento: intermedio



Fig. 49: Ejemplar de *V. caven*



Fig. 50: Inflorescencias



Fig. 51: Frutos

### **Para una correcta plantación:**

- Evitar el riego la noche anterior a la plantación para que la tierra continúe compactada en las raíces.
- En el lugar donde se va a plantar, se hace un hueco del doble de ancho y profundo respectodel envase del árbol.
- Colocar sobre la basa del hoyo unos 5cm a 10cm de una enmienda o abono (Ej: compost).
- Evitando romper el pan de tierra que contiene a las raíces, retirar el envase y colocar el árbol vigilando que el cuello de la raíz (zona donde ésta se une al tallo) quede al ras del suelo.
- Tratar de que el ejemplar quede recto, utilizando generalmente un tutor a fin de proteger el árbol, señalar y ayudarlo a que crezca hacia arriba.
- Rellenar el hueco donde fue ubicado el árbol/arbusto con tierra de calidad.
- Compactar suavemente la tierra recién colocada y se realiza una olla alrededor que permita la retención de agua de lluvia o riego.

A continuación te compartimos un link para que puedas visualizar de forma ilustrativa una correcta plantación:

<https://www.instagram.com/p/DN8EMddDfKe/?stkn=MWZxdmR4bGVqYzc5bQ>

### **Mantenimiento del árbol posterior a la plantación:**

- Debe regarse con frecuencia durante el primer año, sobre todo en verano, eliminar la maleza que pueda sacarle humedad y protegerlo de las cortadoras de césped y las hormigas.

¡Gracias por sumarte!